PRESTO

Fléole

Fauche et Pâture

- Excellente production 1ère coupe
- Très faible remontaison
- Bonne résistance aux diverses maladies

Identification

Morphotype et précocité

Précocité	½ Tardive	
Date départ en végétation	07/04 *	
Date de début épiaison	01/06 *	
Souplesse	55.9 jours *	
Comportement Estival	--	
Remontaison	2.1 *	
Alternativité	4.9 *	
Pérennité	7.9 *	

* Source: HerbeBook 2024

Productivité

Production 1ère coupe	6.2 *
Production de printemps	9.5 *
Production été / automne	3.1 *
Production annuelle totale	**12.6 ***

* Source: HerbeBook 2024

Résistance aux maladies

Maladies diverses	5.5 *

* Source: HerbeBook 2024

Conseils de culture

Aire de culture

Zones fraiches ou humide

Préconisations de semis (Kg / ha)

En pur	25 - 30
En association	10% Trèfle Blanc

Les informations sur les variétés, les recommandations et les représentations mentionnés sur ce site Web sont fondés sur l'état actuel de nos connaissances et croyances, mais sans garantie d'exhaustivité ou d'exactitude. Nous ne pouvons garantir que les propriétés décrites sont reproductibles. Toutes les informations sont fournies pour aider à la prise de décision. Les compositions des mélanges peuvent changer si les variétés individuelles ne sont pas disponibles. Statut 01/2024, modifications réservées.