

Essentiellement Fauche

- ✓ Très bonne résistance aux rouilles
- ✓ Excellente pérennité
- ✓ La référence en rendement

Identification

Morphotype et précocité

Ploïdie	4n	Tétraploïde
Туре	Intermédiaire	
Pérennité	7.3	
Date départ en végétation	19/03 *	
Date de début épiaison	04/05 *	
Souplesse	45.7 *	
Verse	5.8 *	
Remontaison	3.1 *	
Alternativité	1.2 *	

^{*} Source: HerbeBook 2024

Productivité

Production 1ère coupe	7.1 *
Production de printemps	10.4 *
Production été / automne	3.1 *
Production annuelle totale	13.5



Résistance aux maladies

Rouille	7
Helminthosporiose	6.5

^{*} Source: HerbeBook 2025

Conseils de culture

Aire de culture

Régions : toutes zones

Préconisations de semis (Kg / ha)

En pur	30
En association	30% Trèfle Violet

Les informations sur les variétés, les recommandations et les représentations mentionnés sur ce site Web sont fondés sur l'état actuel de nos connaissances et croyances, mais sans garantie d'exhaustivité ou d'exactitude. Nous ne pouvons garantir que les propriétés décrites sont reproductibles. Toutes les informations sont fournies pour aider à la prise de décision. Les compositions des mélanges peuvent changer si les variétés individuelles ne sont pas disponibles. Statut 01/2024, modifications réservées.

